

Patient unter oraler Antikoagulation

Perioperatives Management

Pat.-Daten:

--

Patient unter Sintrom®

Patient „teilweise“ antikoaguliert (INR ~2)

- **1 Woche präoperativ (_____):**
 - **Sintrom®** absetzen
 - **Kontrolle Thrombozytenzahl**
- **am Tag nach Absetzen von Sintrom® (_____):**
 - Beginn mit „Teil-Heparinisierungs-Dosis“ an LMWH
 - 1xtgl 1mg/kgKG(oder: 2xtgl. 0,5mg/kgKG) **Lovenox®**
(z.B: 80kg 1x80mg (oder 2x40mg) **Lovenox®**)
 - **CAVE: Dosis-Reduktion bei Nieren-Insuffizienz! (s. Pharma-Information)**
- **am Tag 1 nach Beginn mit LMWH (_____):**
 - **Kontrolle der Thrombozytenzahl**
- **am Tag präoperativ(_____):**
 - Auslassen der abendlichen **Lovenox®**-Gabe
 - **Kontrolle der Thrombozytenzahl**
- **OP-Tag (_____):**
 - keine **Lovenox®**-Gabe morgens
 - erste **Lovenox®**-Dosis abends
(in Abhängigkeit von der Art des Eingriffs)
- **post-operativ:**
 - **Lovenox®**-Dosis reduziert
(in Abhängigkeit von der Art des Eingriffs)
 - Dauer der reduzierten **Lovenox®**-Dosis in Abhängigkeit von der Art des Eingriffs
- **bei Rück-Umstellung auf Sintrom®:**
 - **Lovenox®** weiter, bis **Ziel-INR** erreicht ist

Kontrollen der Thrombozytenzahl:

vor LMWH	Tag 1 nach LMWH	Tag 6 nach LMWH	Tag 14 nach LMWH